



Меридиан легких (Л, Р)

Время максимальной активности с 3 до 5 часов*
Время пассивности с 5 до 7 часов

Показания к применению**
меридиана легких:

- 1) кашель, одышка, ощущение удушья, другие симптомы заболевания легких и верхних дыхательных путей, бронхиальная астма, хронический тонзиллит;
- 2) боль в области грудной клетки, ключицы, спины, плеча, предплечья, в плечевом, локтевом и лучезапястном суставах; онемение в области передневнутренней поверхности руки; неврит лучевого нерва;
- 3) воспалительные заболевания рта и глотки, кривоточивость десен, носовое кровотечение; неврит лицевого нерва; повышение температуры,очные поты; кожные сыпи, кожные заболевания, сопровождающиеся зудом; головная боль, бессонница, тревожное состояние; заболевания сердца.



Внутренний ход меридианов
показан на рисунках пунктирной линией,
наружный – сплошной линией.

Стандартные точки меридиана легких:
тонизирующая – 9I тай-юань,
седативная – 5I чи-цзе,
пособник – 9I тай-юань,
сочувственная – 13VII фэй-шу,
сигнальная – 1I чжун-фу,
противоболевая – 6I кун-цзуй,
стабилизирующий ло-пункт к меридиану толстой кишки – 7I ле-цио.

Точка 7I – точка-ключ чудесного меридиана V.


* По местному времени.

** Здесь и далее под пунктом 1) даны показания, связанные с внутренним ходом меридиана; 2) – показания, связанные с наружным ходом меридиана; под пунктом 3) – прочие показания.

1I чжун-фу;
2I юнь-мэнь;
3I тянь-фу;
4I ся-бай;
5I чи-цзе;
6I кун-цзуй;
7I ле-цио;
8I цзин-циой;
9I тай-юань;
10I юй-ци;
11I шао-шан.

Меридиан толстой кишки (II, GI)

Время максимальной активности с 5 до 7 часов
Время пассивности с 7 до 9 часов




Стандартные точки меридиана толстой кишки:
тонизирующая – 11II цюй-чи,
седативная – 2II эр-цзянь,
пособник – 4II хэ-гу,
сочувственная – 25VII да-чан-шу,
сигнальная – 25III тянь-шу,
противоболевая – 7II вэнь-лю,
стабилизирующий ло-пункт к меридиану легких – 6II пянь-ли.

Показания к применению
меридиана толстой кишки:

- функциональные заболевания толстой кишки, нарушение проходимости через толстую кишку, запор, понос, пищевые токсико-инфекционные заболевания; воспалительные процессы в миндалинах, горле, трахее, легком, толстой кишке; острый и хронический ринит, вазомоторный ринит, кровотечение из носа;
- боль в пальцах, в области предплечья, плеча, лопаток, грудной клетки, в лучезапястном, локтевом, плечевом суставах; онемение в области предплечья и плеча; нарушение двигательной функции верхней конечности; напряжение мышц шейно-затылочной области; звон и шум в ушах, понижение слуха; воспалительные заболевания полости рта, зубная боль;
- лихорадочные заболевания; гипертоническая болезнь; гипотония; болезни сердца.

Точка 4II – «точка от ста болезней».



Меридиан II заканчивается точкой 20II у крыла носа с противоположной стороны.



1II шан-ян;
2II эр-цзянь;
3II сань-цзянь;
4II хэ-гу;
5II ян-си;
6II пянь-ли;
7II вэнь-лю;
8II ся-лянь;
9II шан-лянь;
10II шоу-сань-ли;
11II цой-чи;
12II чжоу-ляо;
13II шоу-у-ли;
14II би-нао;
15II цзянь-юй;
16II цзуй-гу;
17II тянь-дин;
18II фу-ту;
19II хэ-ляо;
20II ин-сян.

Меридиан желудка (III, Е)

Время максимальной активности с 7 до 9 часов
Время пассивности с 9 до 11 часов



Показания к применению меридиана желудка:

- 1) боль в подложечной области, в области подреберья, пупка, внизу живота; язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, гастроэнтерит; урчание в животе, метеоризм, отрыжка, рвота, запор, понос, снижение аппетита;
- 2) головная боль, зубная боль, межреберная невралгия, боль в грудных железах, в области передней брюшной стенки, передней поверхности бедра и голени, тыльной поверхности стопы, в коленном суставе; онемение в области бедра, колена и голени, холодные стопы, воспаление в области тыльной поверхности стопы; неврит лицевого нерва; воспалительные процессы: синусит, гонит, артриты суставов стоп; отечность лица;
- 3) заболевания органов дыхания, горла, гортани; заболевания наружных половых органов; гинекологические заболевания; артериальная гипертония; маниакальное состояние, депрессия; эпилепсия.

Точка 36III – «точка от ста болезней».

Точка 37III регулирует функцию толстой кишки.

Точка 39III регулирует функцию тонкой кишки.

Стандартные точки меридиана желудка:

тонизирующая – 41III цзе-си,

седативная – 45III ли-дуй,

пособник – 42III чун-ян,

сочувственная – 21VII вэй-шу,

сигнальная – 12XIV чжун-вань,

противоболевая – 34III лян-циу,


стабилизирующий ло-пункт к меридиану

селезенки – поджелудочной железы – 40III фэн-лун.

1III чэн-ци;
2III сы-бай;
3III цзюй-ляо;
4III ди-цан;
5III да-ин;
6III цзя-чэ;
7III ся-гуань;
8III туо-вэй;
9III жэнь-ин;
10III шуй-ту;
11III ци-шэ;
12III цюэ-пэнь;
13III ци-ху;
14III ку-фан;
16III у-и;
16III ин-чуан;
17III жу-чжун;
18III жу-гэнь;
19III бу-жун;
20III чэн-мань;
21III лян-мэнь;
22III гуань-мэнь;
23III тай-и;
24III хуа-жоу-мэнь;
25III тянь-шу;
26III вай-лин;
27III да-цзюй;
28III шуй-дао;
29III гуй-лай;
30III ци-чун;
31III би-гуань;
32III фу-ту;
33III инь-ши;
34III лян-циу;
35III ду-би;
36III цзу-сань-ли;
37III шан-цзюй-сюй;
38III тяо-коу;
39III ся-цзюй-сюй;
40III фэн-лун;
41III цзе-си;
42III чун-ян;
43III сянь-гу;
44III нэй-тин;
45III ли-дуй.

Меридиан тонкой кишки (VI, GI)

Время максимальной активности с 13 до 15 часов
Время пассивности с 15 до 17 часов



Точка 3VI – точка-ключ
чудесного меридиана I.


1VI шао-цзэ;
2VI цянь-гу;
3VI хоу-си;
4VI вань-гу;
5VI ян-гу;
6VI ян-лао;
7VI чжи-чжэн;
8VI сяо-хай;
9VI цзянь-чжэнь;
10VI нао-шу;
11VI тянь-цзун;
12VI бин-фэн;
13VI цюй-юань;
14VI цзянь-вай-шу;
15VI цзянь-чжун-шу;
16VI тянь-чуан;
17VI тянь-жун;
18VI цюань-ляо;
19VI тин-гун.

Показания к применению
меридиана тонкой кишки:

- 1) диспепсические нарушения (тошнота, рвота, снижение аппетита, запор, понос), боль в области пупка и нижней части живота;
- 2) боль в пальцах руки, в области задне-наружной поверхности предплечья и плеча, в плечелопаточной области, затылке; головная боль; боль и отек в области шеи и лица; снижение слуха, шум в ушах;
- 3) нервно-психические заболевания; судороги у детей.

Стандартные точки меридиана тонкой кишки:
тонизирующая – 3VI хоу-си,
седативная – 8VI сяо-хай,
пособник – 4VI вань-гу,
сочувственная – 27VII сяо-чан-шу,
сигнальная – 4XIV гуань-юань,
противоболевая – 6VI ян-лао,
стабилизирующий ло-пункт к меридиану сердца – 7VI чжи-чжэн.

Меридиан мочевого пузыря (VII, V)





Время максимальной активности с 15 до 17 часов
Время пассивности с 17 до 19 часов

Показания к применению
меридиана мочевого пузыря:

- 1) недержание или задержка мочи, анурия, олигурия; цистит, нефрит, пиелонефрит; боль и отек в наружных половых органах;
- 2) боль в области затылка, грудного отдела позвоночника, поясничной области, напряжение мышц этих областей, люмбаго, ишиас; боль в суставах нижней конечности, стопе, пятке, мизинце; паралич и парез нижних конечностей; судороги мышц голени; головная боль в лобно-затылочной области, головокружение; заболевания носа; заболевания глаз;
- 3) болезни сердца, легких, органов желудочно-кишечного тракта, органов малого таза; геморрой.

Точка 62 VII – точка-ключ чудесного меридиана II.



1VII цин-мин;
2VII цуань-чжу;
3VII мэй-чун;
4VII цуй-ча;
5VII у-чу;
6VII чэн-гуань;
7VII тун-тянь;
8VII ло-цюе;
9VII юй-чжэнь;
10VII тянь-чжу;
11VII да-чжу;
12VII фэн-мэнь;
13VII фэй-шу;
14VII цзюе-инь-шу;
15VII синь-шу;
16VII ду-шу;
17VII гэ-шу;
18VII гань-шу;
19VII дань-шу;
20VII пи-шу;
21VII вэй-шу;
22VII сань-цзяо-шу;
23VII шэнь-шу;
24VII ци-хай-шу;
25VII да-чан-шу;
26VII гуань-юань-шу;
27VII сяо-чан-шу;
28VII пан-гуань-шу;
29VII чжун-люй-шу;
30VII бай-хуань-шу;
31VII шан-ляо;
32VII цы-ляо;
33VII чжун-ляо;
34VII ся-ляо;
35VII хуэй-ян;
36VII чэн-фу;
37VII инь-мэнь;
38VII фу-си;
39VII вэй-ян;
40VII вэй-чжун;
41VII фу-фэнь;
42VII по-ху;
43VII гао-хуан;
44VII шэнь-тан;
45VII и-си;
46VII гэ-гуань;
47VII хунь-мэнь;
48VII ян-ган;
49VII и-шэ;
50VII вэй-цан;
51VII хуань-мэнь;