

А

А- (перед гласными ан-, греч. а-, an-) – приставка, означающая отсутствие признака или качества, выраженного во второй части слова; соответствует русским приставкам “без-”, “не-”.

ААРОНА СИМПТОМ (Ch.D.Aaron, 1866–1951, амер. врач) – боль в надчревной или левой подреберной области при надавливании в точке Мак-Бернея; признак аппендицита.

АБ- (абс-, лат. ab-, abs-) – приставка, означающая “удаление”, “отклонение”; соответствует русской приставке “от-”.

АБАДИ СИМПТОМ (J.A.Abadie, 1873–1932, франц. невропатолог) – отсутствие болезненности при сдавливании пяточного (ахиллового) сухожилия; наблюдается при tabes dorsalis.

АБАЗИЯ (abasia; а- + греч. basis шар) – неспособность ходить, связанная с расстройствами равновесия тела или с двигательными нарушениями нижних конечностей (параличами, гиперкинезами, мышечными спазмами).

АБАЗИЯ-АСТАЗИЯ – см. Астазия-абазия.

АБАЛИХИНА – ПИВОВАРОВА МЕТОД (А.А.Абалихина, отец. рентгенолог; В.П. Пивоваров, род. в 1895 г., отец. офтальмолог) – метод рентгенографии глазницы в полуаксиальной плоскости расположена горизонтально под подбородком, лицо слегка наклонено вперед, взор фиксирован в горизонтальном направлении и профилировочных проекциях; используется для определения локализации интраглазных инородных тел.

АББИ ПЛАСТИКА ГУБЫ (R.Abbé, 1851–1928, амер. хирург) – пластическая операция замещения дефекта губы кожнохрящевым лоскутом на ножке, сформированным из тканей другой губы.

АББОТТА РЕДРЕССИРУЮЩИЙ КОРСЕТ (Е.Г.Абботт, совр. амер. ортопед) – см. Абботта редрессирующий корсет.

ABBREVIATA CAUCASICA – вид гельминта сем. Physalopteridae кл. нематод; окончательные хозяева – обезьяна, режé человек, у к-рых А.с. паразитирует в желудке, пищеводе, тонкой кишке; промежуточные хозяева – различные позвоночные животные.

АБРЕВИАЦИЯ (лат. abbreviatio сокращение) в биологии – сокращение цикла индивидуального развития органов или их частей за счет выпадения отдельных стадий онтогенеза, приводящее к недоразвитию или редукции органов у потомков.

АБДЕРГАЛЬДЕНА – КАУФМАННА – ЛИНЬКА СИНДРОМ (E.Aberdalden, 1877–1950, швейц. биохимик и физиолог; E.Kaufmann, 1860–1931, нем. патолог; G.O.E.Lignac, 1891–1954, голландский патолог) – см. Цистиноз.

АБДЕРГАЛЬДЕНА – ФАНКОНИ СИНДРОМ (E.Aberdalden, 1877–1950, швейц. биолог и физиолог; G.Fanconi, род. в 1892 г., швейц. педиатр) – см. Цистиноз.

АБДОМИНАЛИЗАЦИЯ СЕРДЦА (истор.; син. абдоминоперикардиостомия) – хирургическая операция наложения соустья между полостью перикарда и брюшной полостью при хронической коронарной недостаточности.

АБДОМИНАЛЬНЫЙ (abdominalis; лат. abdomus, abdominis живот) – брюшной, относящийся к животу.

АБДОМИНО- (лат. abdomen, abdominis живот) – составная часть сложных слов, означающая “относящийся к животу, к брюшной полости”.

АБДОМИНОПЕРИКАРДИОСТОМИЯ (истор.; abdominopericardiotomia; абдомино- + анат. pericardium перикард + греч. stoma отверстие) – см. Абдоминализация сердца.

АБДОМИНОСКОПИЯ (абдомино- + греч. skopeō рассматривать) – см. Перитонеоскопия.

АБДУКТОР (musculus abductor; лат. abduco, abducere отводить) – мышца, осуществляющая отведение конечности или ее части (напр., пальца).

АБДУКЦИОННЫЙ ФЕНОМЕН – сужение зрачка при интенсивном отведении глаза; наблюдается при нек-рых поражениях Ц.н.с.

АБДУКЦИЯ (лат. abducere, от abduco, abducere отводить) – см. Отведение.

АБЕЛЕВА – ТАТАРИНОВА РЕАКЦИЯ (Г.И.Абелев, род. в 1928 г., отец. иммунолог; Ю.С.Татаринов, род. в 1928 г., отец. биохимик) – см. Альфа-фетопротеиновый тест.

АБЕЛЛЯ МЕТОД (L.L.Abell, род. в 1909 г., амер. биохимик) – колориметрический метод количественного определения общего холестерина в сыворотке крови, основанный на использовании реакции Либерамана – Бурхарда.

АБЕЛЯ – ЛЕВЕНБЕРГА ПАЛОЧКА (устар.; R.Abel, 1868–1942; нем. бактериолог; В.В.Löwenberg, 1836–1905, франц. оториноларинголог) – см. Палочка озены.

АБЕРКРОМБИ СИНДРОМ (J.Abercrombie, 1780–1844, шотл. врач) – см. Амиллоидоз системный.

АБЕРРАНТНЫЙ (лат. aberrans, aberrantis отклоняющийся) – отклоняющийся от нормального строения, расположения или состояния (напр., aberrантный кровеносный сосуд, aberrантный участок хромосомы и т.д.).

АБЕРРАНТНЫЙ КОМПЛЕКС QRS – см. Желудочковый комплекс ЭКГ aberrантный.

ABERRATION MENTAL (устар.; франц. “психическое отклонение”) – общее название психических болезней во французской психиатрии 19-го века.

АБЕРРАЦИЯ (лат. aberratio отклонение) – индивидуальное отклонение в строении или функции от нормы.

АБЕРРАЦИЯ ГЛАЗА – искажение изображения на сетчатке вследствие несовершенства оптической системы глаза.

А. Г. ДИФРАКЦИОННАЯ – А.г., обусловленная дифракцией, возникающей при прохождении световых лучей через суженный зрачок.

А. Г. СФЕРИЧЕСКАЯ – А.г., обусловленная различием в преломляющей способности центральных и периферических отделов роговицы и хрусталика.

А. Г. ХРОМАТИЧЕСКАЯ – А.г., обусловленная неодинаковым преломлением оптической системой глаза световых лучей с различной длиной волны.

АБЕРРАЦИЯ ПОЛОВАЯ – см. Половое излучение.

АБЕРРАЦИЯ ПОЛУХРОМАТИДНАЯ – хромосомная aberrация, затрагивающая продольную половину одной хроматиды.

АБЕРРАЦИЯ ХРОМАТИДНАЯ – хромосомная aberrация, затрагивающая только одну хроматиду, т.е. возникшая после ближайшей предшествующей редупликации хромосом.

АБЕРРАЦИЯ ХРОМОСОМНАЯ – изменение структуры хромосомы, вызванное ее разрывом с последующим перераспределением, утратой или частичным удвоением генетического материала.

АБЕТАЛИПРОТЕИНЕМИЯ (abetalipoproteinemia; а- + бета-липопротеины + греч. haima кровь; син.: акантоцитоз, Бессена – Корнфелта синдром) – наследственная болезнь, характеризующаяся нарушением всасывания и транспорта жиров, недостаточностью или отсутствием бета-липопротеинов, недостаточностью высших полиненасыщенных жирных кислот и низким уровнем

холестерина и фосфатидов в крови; проявляется акантозом, пигментной дегенерацией сетчатки, атаксией, наличием в крови акантоцитов; наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ – факторы неорганической природы, влияющие на живые организмы.

АБИОТРОФИЯ (истор.; abiotrophia; а- + греч. bios жизнь + trophē питание) – скрытая аномалия органа или системы организма, проявляющаяся преждевременным ослаблением функций при обычном уровне деятельности.

АБИОТРОФИЯ СЕТЧАТКИ – см. Дегенерация тапетореетинальная.

АБИОТРОФИЯ СЕТЧАТКИ БЕЛОТОЧЕЧНАЯ – см. Дегенерация сетчатки точечная белая.

АБИОТРОФИЯ СЕТЧАТКИ ПИГМЕНТНАЯ – см. Дегенерация сетчатки пигментная.

АБЛАСТИКА (ablastica; а- + греч. blastikos пускающий ростки, прорастающий) – хирургический принцип профилактики рецидива и метастазирования злокачественной опухоли, заключающийся в ее удалении единым блоком с путями лимфооттока в пределах здоровых тканей.

АБЛЕФАРИЯ (ablepharia; а- + греч. blepharon веко) – аномалия развития; отсутствие век и глазной щели; как правило, сочетается с недоразвитием глазного яблока.

АБЛЮТОМАНИЯ (ablutomania; лат. abluo, ablutum мыть + mania) – навязчивое стремление к мытью рук.

АБЛЯЦИЯ (истор.; лат. ablatio отнятие) в медицине – хирургическая операция удаления органа или какой-либо части тела.

АБОРАЛЬНЫЙ (aboralis; аб- + лат. os, oris рот) – дальний относительно ротового отверстия; применяется гл. обр. по отношению к элементам желудочно-кишечного тракта.

АБОРТ (abortus; лат.; син. выкидыш) – прерывание беременности в первые 22 недели, когда плод еще нежизнеспособен.

А. ИСКУССТВЕННЫЙ (a. artificialis) – А., вызванный преднамеренно воздействием непосредственно на плодное яйцо, плод, вместилище или организм беременной.

А. КРИМИНАЛЬНЫЙ (a. criminalis; син.: А. незаконный, А. преступный) – искусственный А., произведенный вне лечебного учреждения.

А. МЕДИЦИНСКИЙ (a. medicinalis) – искусственный А., производимый врачом в специализированном отделении больницы или в родильном доме.

А. НАЧАВШИЙСЯ (a. incipiens) – стадия самопроизвольного А., характеризующаяся выраженными болями внизу живота и кровянистыми выделениями при не полностью открытом наружном зеве шейки матки.

А. НЕЗАКОННЫЙ – см. Аборт криминальный.

А. НЕПОЛНЫЙ (a. incompletus) – стадия самопроизвольного А., характеризующаяся наличием в матке частей плодного яйца.

А. ПОЗДНИЙ (a. tardus) – А. при сроке беременности от 12 (считалось и от 16) недель.

А. ПОЛНЫЙ (a. completus) – последняя стадия самопроизвольного А., характеризующаяся выходением из матки всего плодного яйца.

А. ПРЕСТУПНЫЙ – см. Аборт криминальный.

А. ПРИВЫЧНЫЙ – см. Выкидыш привычный.

А. РАННИЙ (a. praecox) – А. при сроке беременности до 12 недель.

А. САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ (a. spontaneus) – А., начавшийся или произошедший без преднамеренных действий беременной или других лиц с целью прерывания беременности.

А. ТРУБНЫЙ (a. tubarius) – самопроизвольный А. при трубной беременности, характеризующийся изгнанием плодного яйца из маточной трубы в брюшную полость.

А. УГРОЖАЮЩИЙ (a. imminens) – начальная стадия самопроизвольного А., характеризующаяся болями внизу живота при закрытом канале шейки матки.

А. В ХОДУ (a. progrediens) – стадия самопроизвольного А., при к-рой плодное яйцо полностью (или почти полностью) отделилось от стенки матки, но находится еще в ее полости или в канале шейки матки.

А. ШЕЕЧНЫЙ (a. cervicalis) – стадия самопроизвольного А., при к-рой плодное яйцо, изгнанное из полости матки, задерживается в канале шейки матки.

АБОРТ ЛЕЙКЕМИЧЕСКИЙ (abortus leukaemicus) – см. Лейкемическое зияние.

АБОРТИВНЫЙ (лат. abortivus недоразвитый, преждевременный) – 1) не достигший полного развития (напр., А. форма болезни); 2) быстро приостанавливающий развитие болезни (напр., А. метод лечения).

АБОРТЦАНГ (нем. Abortzange) – зажим для захвата и удаления из матки частей плодного яйца при аборте.

АБРАЖАНОВА ПЛАСТИКА (А.А.Абражанов, 1867–1931, отец хирург) – пластическая операция закрытия множественных бронхиальных свищей лоскутом на ножке, сформированным из широчайшей мышцы спины.

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (лат. abrasio соскабливание) – мелкозернистые или порошкообразные вещества высокой твердости; в медицине применяются для шлифования и полировки зубных протезов.

АБРАЗИЯ (устар.; лат. abrasio соскабливание) – см. Выскабливание.

АБРАМИ СИНДРОМ (P.Abrami, 1879–1943, франц. врач; син.: Видала – Абрами болезнь, синдром энтерогепатический) – восходящая коли-инфекция печени с явлениями хронического холангита.

АБРАМОВА – ФЙДЛЕРА МИОКАРДИТ (С.С.Абрамов, отец. врач конца 19 – начала 20 в.; С.Л.Fiedler, 1835–1921, нем. врач) – см. Миокардит идиопатический.

АБРАХИЯ (abrachia; a- + греч. brachion рука) – аномалия развития: отсутствие верхних конечностей.

АБРИКОСОВА МЕТОД (А.И.Абрикосов, 1875–1955, отец. патологоанатом) – 1) метод балнизирования трупа, состоящий в заполнении сосудов формалиноглицериновой смесью с последующим выдерживанием трупа в жидкости того же состава; 2) метод вскрытия трупа, при к-ром органы извлекают комплексами, составляющими анатомо-физиологические системы (комплекс органов шеи и грудной клетки; печень, желудок и двенадцатиперстная кишка; почки, мочевые пути и половые органы; головной и спинной мозг).

АБРИКОСОВА ОПУХОЛЬ (А.И.Абрикосов) – см. Миобластома зернисто-клеточная.

АБС- – см. Аб-.

АБСАНС (франц. absence отсутствие) – кратковременная потеря (или угнетение) сознания с последующей амнезией; симптом эпилепсии.

А. АВТОМАТИЗМА – сложный А., характеризующийся стереотипно повторяющимися двигательными актами: движениями губ или языка, жестами, привычными автоматизированными действиями (приведение в порядок одежды, прически и т.п.).

А. АТОНИЧЕСКИЙ – сложный А. с потерей мышечного тонуса, сопровождающийся падением.

А. ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ – сложный А. с повышением мышечного тонуса; проявляется обычно сочетанным разгибанием головы и отведением глазных яблок вверх, иногда выгибанием туловища назад.

А. МИОКЛОНИЧЕСКИЙ – сложный А. с двусторонней ритмической миоклонией, преимущественно мышц лица и верхних конечностей.

А. ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ – А. с длительным (до нескольких часов) помрачением сознания.

А. ПРОСТОЙ (син. А. чистый) – А., не сопровождающийся какими-либо движениями или действиями.

А. РЕТОКУРСИВНЫЙ – гипертонический А. с выгибанием туловища кзади и с шагом назад для сохранения равновесия.

А. РЕТОПУЛЬСИВНЫЙ – гипертонический А. с выгибанием туловища кзади.

А. СЛОЖНЫЙ – А., сопровождающийся непроизвольными движениями или действиями.

А. СУБКЛИНИЧЕСКИЙ – А. с неполной потерей сознания.

А. ЧИСТЫЙ – см. Абсанс простой.

А. ЭНУРЕТИЧЕСКИЙ – сложный А. с непроизвольным мочеиспусканием.

АБСЕНТИЗМ (absinthismus; франц. absinthe полынная водка, абсент) – форма хронического алкоголизма, обусловленная употреблением абсента (полынной водки).

АБСОЛЮТНО ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗОНА – см. Суперэкстремальная зона.

АБСОРБЦИОМЕТР (истор.; лат. absorptio поглощение + греч. metreo измерять) – прибор для анализа газов крови путем их извлечения в вакуум с последующим поглощением химическими реактивами; сконструирован И.М.Сеченовым.

АБСОРБЦИЯ (лат. absorptio поглощение) – поглощение газа или растворенного вещества всей массой жидкости или твердого тела; А. газов лежит в основе газообмена между организмом и окружающей средой.

АБСТИНЕНЦИЯ (лат. abstinencia воздержание; син. синдром абстинентный) – состояние, возникающее в результате внезапного прекращения приема (введения) веществ, вызвавших токсикоманическую зависимость, или после введения их антагонистов; характеризуется психическими, вегетативно-соматическими и неврологическими расстройствами; клиническая картина и течение А. зависят от типа вещества, дозы и продолжительности его употребления.

АБСТИНЕНЦИЯ ПОЛОВАЯ (abstinencia sexualis; син.: депривация половая, половое воздержание) – вынужденное или сознательное снижение половой активности ниже индивидуальной (конституционально-возрастной) потребности.

АБСТИНЕНЦИЯ ПОЛОВАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ – половая абстиненция при наличии суррогатных или непроизвольных форм полового удовлетворения, сопровождаемых оргазмом.

АБСТИНЕНЦИЯ ПОЛОВАЯ ТОТАЛЬНАЯ – половая абстиненция, при к-рой оргазм не наступает ни при каких обстоятельствах.

АБСТРАКЦИЯ (лат. abstractio отвлечение) – психический процесс: мысленное отвлечение от нек-рых сторон, свойств, связей предметов и явлений действительности с целью выделения из их числа наиболее важных (в науке – существенных).

АБСЦЕСС (abscessus; лат., от abscedo, abscessum отделяться, нарывать; син.: апостема, гнойник, нарыв) – полость, заполненная гноем и ограниченная от окружающих тканей и органов пиогенной мембраной.

А. АМЕБНЫЙ (a. amoebicus) – А. печени или головного мозга (реже других органов) при амебиазе, вызванный гематогенной диссеминацией Entamoeba histolytica или ее контактным проникновением в соседние органы; часто бывает множественным.

А. АНОРЕКТАЛЬНЫЙ (a. anorectalis) – А., локализующийся в клетчатке, окружающей анальную часть прямой кишки и задний проход; возникает при подкожном или подслизистом парапроктите.

А. АПИКАЛЬНЫЙ (a. apicalis) – А., локализующийся в области верхушки корня зуба; возникает при остром или обострившемся верхушечном периодонтите.

А. АППЕНДИКУЛЯРНЫЙ (a. appendicularis) – А., локализующийся в полости брюшины или в ретрокальной клетчатке и возникающий как осложнение острого аппендицита.

А. АСЕПТИЧЕСКИЙ (a. asepticus) – А. в результате попадания в ткань веществ, способных вызвать нагноение без участия возбудителей гнойной инфекции.

АБСПЕСС БРОДИ – см. Бродя абсцесс.

А. ГАНГРЕНОЗНЫЙ (a. gangraenosus; син.: А. гнилостный, А. пугридный) – А., содержащий гнилостный гной и секвестры или детрит.

А. ГАНГРЕНОЗНЫЙ ГАЗОВЫЙ (a. gangraenosus gaseus) – А.г., содержащий газ, образовавшийся в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

А. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ (a. haemorrhagicus) – А., в содержимом к-рого имеется примесь крови; развивается при инфицировании и нагноении гематомы или вследствие кровоизлияния в полость А.

А. ГНИЛОСТНЫЙ (a. putridus) – см. Абсцесс гангренозный.

А. ГОЛОВНОГО МОЗГА (a. cerebri) – А., формирующийся в тканях головного мозга в результате попадания в них возбудителей гнойной инфекции из других очагов или при черепно-мозговой травме.

А. ГОЛОВНОГО МОЗГА КАРДИОПАТИЧЕСКИЙ (a. cerebri cardiopathicus) – метастатический А.г.м., при к-ром источником метастаза является воспалительно измененный эндокард; возникает у детей с врожденными пороками сердца синего типа, т.е. обр. при тетраде Фалло.

А. ГОЛОВНОГО МОЗГА КОНТАКТНЫЙ (a. cerebri contactus) – А.г.м., развивающийся в результате распространения возбудителей инфекции из близко расположенного очага гнойного воспаления (из среднего уха, околоушных слухов, гланд, костей черепа).

А. ГОЛОВНОГО МОЗГА МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ (a. cerebri metastaticus) – А.г.м., развивающийся в результате гематогенного или лимфогенного распространения возбудителей гнойной инфекции из отдаленного гнойного очага или при септикопиемии.

А. ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТОГЕННЫЙ (a. cerebri otogenus) – А.г.м., развивающийся в результате распространения возбудителей инфекции из среднего уха при хроническом (реже остром) гнойном отите.

А. ГОЛОВНОГО МОЗГА РИНОГЕННЫЙ (a. cerebri rhinogenus) – А.г.м., развивающийся в результате распространения возбудителей инфекции при гнойном воспалении или травме околоушных слухов (чаще лобных).

А. ГОЛОВНОГО МОЗГА ТРАВМАТИЧЕСКИЙ (a. cerebri traumaticus) – А.г.м., развивающийся в результате инфицирования и нагноения тканей мозга, поврежденных при черепно-мозговой травме.

А. ГОЛОВНОГО МОЗГА ЭЗОФАГОГЕННЫЙ (a. cerebri esophagogenus) – метастатический А.г.м., развивающийся в результате распространения возбудителей инфекции из пищевода при хроническом гнойном эзофагите; возникает чаще у де-

тей с ожоговым сужением пищевода после длительного букширования.

А. ГОРЯЧИЙ (устар.; *a. calidus*) – см. *Абсцесс острый*.

А. ДЕСНЕВОЙ (*a. gingivalis*; син. *А. субгингивальный*) – *А.*, локализующийся в тканях десны; возникает при наличии патологического зубодесневого кармана или в результате механической травмы десны.

АБСЦЕСС ДЮБУА – см. *Дюбуа абсцесс*.

АБСЦЕСС ДЮПОИТРЕНА – см. *Дюпоитрена абсцесс*.

А. ЗАБРЮШИННЫЙ (*a. retroperitonealis*) – *А.*, локализующийся в забрюшинном пространстве; возникает при панкреатите, повреждении задней стенки двенадцатиперстной кишки, паранефритах и т.д.

А. ЗАГЛОТОЧНЫЙ (*a. retropharyngeus*; син.: *А. позадилоглоточный*, *А. ретрофарингеальный*) – *А.*, локализующийся в заглоточном пространстве.

А. ЗАГЛОТОЧНЫЙ ОСТРЫЙ (*a. retropharyngeus acutus*) – *А.*, развивающийся в результате распространения возбудителей инфекции при острых воспалительных процессах в носоглотке и задних отделах носа (гл. обр. у детей), а также при травмах задней стенки глотки.

А. ЗАГЛОТОЧНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ (*a. retropharyngeus chronicus*) – *А.*, развивающийся в результате туберкулезного поражения верхних шейных позвонков или заглоточных лимфатических узлов.

А. ЗАПОНОЧНЫЙ – см. *Knopfen-abscess*.

А. ЗАУШНЫЙ (*a. retroauricularis*) – *А.*, локализующийся в мягких тканях позади ушной раковины или под надкостницей соседнего отростка; развивается при мастоидите в результате прорыва гноя через наружный кортикальный слой сосцевидного отростка или при гнойном лимфадените.

А. ИНКАПСУЛИРОВАННЫЙ (*a. incapsulatus*) – *А.*, имеющий мощную пиогенную мембрану, в к-рой грануляционная ткань по периферии замещена толстой рубцовой оболочкой.

А. ИНТРАММАММАРНЫЙ (*a. intramammaricus*) – *А.*, локализующийся в паренхиме молочной железы; возникает при глубокой форме гнойного мастита.

А. ИШИОРЕКТАЛЬНЫЙ (*a. ischiorectalis*) – *А.*, локализующийся в клетчатке седлищно-прямокишечного пространства; возникает при глубоком парапроктите.

А. КОНГЕСТИВНЫЙ (устар.; *a. congestivus*) – см. *Натечник*.

А. КОСТИ (*a. ossis*) – *А.* в компактном веществе кости; возникает при хроническом остеомиелите.

А. ЛЁГКОГО (*a. pulmonis*) – *А.*, развивающийся в легочной ткани как осложнение пневмонии, реже – в результате заноса возбудителей гнойной инфекции гематогенным, лимфогенным путем или с инородным телом.

А. МЕЖКИШЕЧНЫЙ (*a. interintestinalis*) – *А.*, локализующийся в брюшной полости между петлями кишечника; возникает при ограниченном гнойном перитоните.

А. МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ (*a. metastaticus*; син. *метастаз гнойный*) – *А.*, развивающийся вследствие гематогенного или лимфогенного переноса возбудителей гнойной инфекции из отдаленного очага или при септикопиемии.

А. МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ ПИЕМИЧЕСКИЙ (*a. metastaticus pyaemicus*) – *А.*, чаще множественный, образующийся при пиемии и септикопиемии; является основным проявлением общей гнойной инфекции.

А. МИНДАЛИКОВЫЙ (*a. tonsillaris*; син. *А. тонзиллярный*) – *А.*, развивающийся в паренхиме миндалин при хроническом тонзиллите.

А. МОЗОЛЬНЫЙ (*a. callosus*) – подкожный или субэпидермальный *А.*, развивающийся в результате проникновения возбудителей гнойной инфекции через трещины кожной мозоли (чаще на ладони).

А. НАТЕЧНЫЙ – см. *Натечник*.

А. ОКОЛОГЛОТОЧНЫЙ (*a. parapharyngeus*; син. *А. парафарингеальный*) – *А.*, локализующийся в окологлоточном пространстве; возникает как осложнение воспалительных процессов в глотке, ротовой полости или среднем ухе.

А. ОКОЛОМИНДАЛИКОВЫЙ (*a. paratonsillaris*; син.: *А. паратонзиллярный*, *А. перитонзиллярный*) – *А.*, формирующийся в околоминдаликовой клетчатке в результате предшествующего флегмонозного воспаления; в зависимости от локализации различают верхний (передневерхний), задний и наружный *А.о.*

А. ОСТРЫЙ (*a. acutus*; син. *А. горячий* – устар.) – быстро развивающийся *А.*, сопровождающийся резко выраженными местными воспалительными изменениями с нарушением общего состояния.

А. ПАРАДЕНТАЛЬНЫЙ (*a. paradentalis*) – *А.*, локализующийся в пародонте; возникает при наличии глубокого патологического зубодесневого или костного кармана.

А. ПАРАТОНИЗИЛЛЯРНЫЙ (*a. paratonsillaris*) – см. *Абсцесс околоминдаликовый*.

А. ПАРАУРЕТРАЛЬНЫЙ (*a. paraurethralis*) – *А.*, локализующийся в тканях, окружающих мочеиспускательный канал; возникает, напр., при воспалении желез мочеиспускательного канала у мужчин, при закупорке и инфицировании парауретрального протока у женщин.

А. ПАРАФАРИНГЕАЛЬНЫЙ (*a. parapharyngeus*) – см. *Абсцесс окологлоточный*.

А. ПЕЛЬВИОРЕКТАЛЬНЫЙ (*a. pelviorectalis*) – *А.*, локализующийся в забрюшинной клетчатке малого таза вокруг прямой кишки; возникает при глубоком парапроктите.

А. ПЕРИСИНУОЗНЫЙ (*a. perisinuosus*) – *А.*, локализующийся между внутренней костной стенкой сосцевидного отростка и сигмовидным синусом твердой мозговой оболочки; является, как правило, осложнением мастоидита.

А. ПЕРИТОНИЗИЛЛЯРНЫЙ (*a. peritonsillaris*) – см. *Абсцесс околоминдаликовый*.

А. ПЕЧЕНИ (*a. hepatis*) – *А.*, развивающийся в ткани печени как следствие ее гнойного воспаления; является чаще всего результатом холангита.

А. ПЕЧЕНИ АСКАРИДОЗНЫЙ (*a. hepatis ascaridosus*) – холангитический *А.*, развивающийся вследствие бактериального инфицирования общего желчного или печеночных протоков при проникновении и гибели в них аскарид.

А. ПЕЧЕНИ ПЕРИХОЛЕЦИСТИЧЕСКИЙ (*a. hepatis pericholecysticus*) – *А.*, развивающийся вследствие распространения воспаления на ткань печени при гнойном холецистите.

А. ПЕЧЕНИ ПИЛЕФЛЕБИТИЧЕСКИЙ (*a. hepatis pylophlebiticus*) – *А.*, развивающийся при пилефлебите в результате распространения процесса на конечные внутрипеченочные ветви воротной вены.

А. ПЕЧЕНИ ХОЛАНГИОГЕННЫЙ (*a. hepatis cholangiogenus*) – см. *Абсцесс печени холангитический*.

А. ПЕЧЕНИ ХОЛАНГИТИЧЕСКИЙ (*a. hepatis cholangiticus*; син. *А. печени холангиогенный*) – *А.*, локализующийся по ходу внутрипеченочных желчных протоков и возникающий как осложнение гнойного холангита.

А. ПОДДИАФРАГМАЛЬНЫЙ (*a. subdiaphragmaticus*) – *А.*, локализующийся в поддиафрагмальном пространстве брюшной полости; является, как правило, осложнением гнойных воспалительных процессов органов брюшной полости.

А. ПОДНАДКОСТНИЧНЫЙ (*a. subperiostalis*; син. *А. субпериостальный*) – *А.*, локализующийся под надкостницей; возникает обычно при остром остеомиелите.

А. ПОДПЕЧЕНОЧНЫЙ (*a. subhepaticus*) – *А.*, локализующийся в полости брюшины между нижней поверхностью печени и петлями кишечника; возникает в результате отграниченного гнойного перитонита.

А. ПОЗАДИГЛОТОЧНЫЙ (*a. retropharyngeus*) – см. *Абсцесс заглоточный*.

А. ПОЗАДИМАТОЧНЫЙ (*a. retrouterinus*) – *А.*, локализующийся в прямокишечно-маточном углублении брюшной полости; возникает как осложнение аднексита или, реже, гнойного аппендицита.

А. ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ МНОЖЕСТВЕННЫЙ (*a. sudoriparus multiplex*) – см. *Псевдофурункулез*.

А. ПОЧЕЧНЫЙ (*a. renalis*) – *А.*, локализующийся в почечной паренхиме; одна из форм острого гнойного пиелонефрита.

А. ПРЕПУЗЫРНЫЙ (*a. praevesicalis*) – *А.*, локализующийся в клетчатке, расположенной спереди от мочевого пузыря; возникает, как правило, в результате парапроктита.

А. ПУТРИДНЫЙ (*a. putridus*) – см. *Абсцесс гангренозный*.

А. РЕТРОМАММАРНЫЙ (*a. retromammaricus*) – *А.*, локализующийся в клетчатке позади молочной железы; возникает при глубокой форме гнойного мастита.

А. РЕТРОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ (*a. retropharyngeus*) – см. *Абсцесс заглоточный*.

А. СКУЛОВОЙ (*a. zygomaticus*) – см. *Зигоматический*.

А. СУБАРЕОЛЯРНЫЙ (*a. subareolaris*) – *А.*, локализующийся под кожей около соскового кружка молочной железы; возникает при поверхностной форме гнойного мастита.

А. СУБГИНГИВАЛЬНЫЙ (*a. subgingivalis*) – см. *Абсцесс десневой*.

А. СУБДУРАЛЬНЫЙ (*a. subduralis*) – *А.*, локализующийся под твердой мозговой оболочкой головного или спинного мозга.

А. СУБПЕРИОСТАЛЬНЫЙ (*a. subperiostalis*) – см. *Абсцесс поднадкостничный*.

А. ТОНЗИЛЛЯРНЫЙ (*a. tonsillaris*) – см. *Абсцесс миндаликовый*.

А. ТУБЕРОЗНЫЙ (*a. tuberosus*) – см. *Туберкулез*.

А. ХОЛОДНЫЙ (*a. frigidus*) – хронический *А.* туберкулезной этиологии, характеризующийся слабой выраженностью местной воспалительной реакции и наличием казеозных масс.

А. ХРОНИЧЕСКИЙ (*a. chronicus*) – *А.*, протекающий медленно, при мало выраженных общих и местных симптомах гнойного воспаления; возникает при некротических инфекционных болезнях (туберкулез, актиномикоз и др.) или при проникновении малоинтенсивных возбудителей гнойной инфекции.

АБЦЕСС ЧИТЕЛИ — см. Читатели абсцесс.

А. ЭКСТРАДУРАЛЬНЫЙ (a. extraduralis) — см. Абсцесс эпидуральный.

А. ЭПИДУРАЛЬНЫЙ (a. epiduralis; син. А. экстрадуральный) — А., локализованный между твердой мозговой оболочкой и костями черепа; образуется после открытой черепно-мозговой травмы или в результате нагноения эпидуральной гематомы, распространения гнойного воспаления из среднего уха или околоушных слюнных желез.

А. ЭПИДУРАЛЬНЫЙ СПИНАЛЬНЫЙ (a. epiduralis spinalis) — А., локализованный в эпидуральной клетчатке позвоночного канала; возникает при гнойном спинальном эпидурите.

АБЦЕССОГРАФИЯ (abscess + греч. graphō писать, изображать) — рентгенологическое исследование сформировавшегося абсцесса после искусственного контрастирования его полости.

А. НЕПРЯМАЯ — А., при к-рой для введения контрастного вещества используют имеющийся к абсцессу доступ (дренаж, свищ).

А. ПРЯМАЯ — А., при к-рой для введения контрастного вещества производят пункцию абсцесса.

АБЦЕССОТОМИЯ (abscessotomia; абсцесс + греч. tomē разрез, рассечение) — хирургическая операция вскрытия абсцесса.

ABSCÉSSUS MULTIPLEX INFANTUM — см. Псевдофурункулез.

АБЦЕССЕКТОМИЯ (abscessectomia; абсцесс + эктомия) — хирургическая операция иссечения или выщипывания инкапсулированного абсцесса без его вскрытия.

АБТА — ЛЕТТЕРЕРА — СИВЕ БОЛЕЗНЬ (A.Abt, 1867–1955, амер. педиатр; E.Letterer, род. в 1895 г., нем. патолог; S.Sive, род. в 1897 г., шведский педиатр) — см. Леттерера — Сиве болезнь.

АБУЗУС (лат. abusus употребление, злоупотребление) — непродолжительное (в течение одного или нескольких дней) употребление большого количества алкоголя или наркотических средств, приводящее к выраженной интоксикации.

АБУЗУС МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ (abusus medicamentosus) — употребление лекарственного средства, не вызванное медицинской необходимостью и (или) в больших, чем нужно, количествах.

АБУЛАДЗЕ МЕТОДИКА (К.С.Абуладзе, 1897–1972, отец. физиолог) — 1) способ исследования рефлекторного слезотечения у собак, основанный на оперативном выведении наружу протоков обеих слезных желез; 2) способ исследования рефлекторного слюноотделения у собак, основанный на оперативном выведении наружу симметричных слюнных желез и кровоснабжении.

АБУЛАДЗЕ ПРИЕМ (Д.А.Абуладзе, 1861–1938, отец. акушер-гинеколог) — акушерский ручной прием выделения брюшной стенки путём плотного захватывания обеих прямых мышц живота с образованием вертикальной складки брюшной стенки, после чего роженице предлагают потужиться.

АБУЛИЯ (abulia; a- + греч. bulē воля; син. дисбулия) — патологическое отсутствие желаний и побуждений к деятельности.

АБУ-МУК-МУК — инфекционная болезнь неизвестной этиологии, по клинической картине напоминающая ветряную оспу; зарегистрирована в Центральной Африке.

АБУРЕЛА ОПЕРАЦИЯ (E.A.Aburel, совр. румынский гинеколог) — пластическая операция при множественной миоме матки, заключающаяся в иссечении вместе с узлами опухоли двух локусов на передней и задней поверхности матки, клиновидном иссечении узлов из боковых стенок и формировании матки за счёт сохранившихся боковых стенок.

АБУРЕЛА ПРОБА (E.A.Aburel) — см. Окситоциновая проба.

АБЭМЕРИОНАЛЬНЫЙ ПОЛЮС — полюс бластоцисты (бластодермического пузырька), противоположный полюсу, у к-рого формируется тело собственноразвивающегося зародыша.

АВЕЛЛИСА СИНДРОМ (G.Avellis, 1864–1916, нем. оториноларинголог) — сочетание паралича мягкого нёба и голосовой мышцы на стороне патологического очага в ЦНС с центральным гемипарезом (гемиплегией) на противоположной стороне; относится к бульбарным альтернирующим синдромам, наблюдается при поражении продолговатого мозга на уровне двойного ядра.

АВЕТЬСОВА СПОСОБ (Э.С.Аветисов, род. в 1921 г., отец. офтальмолог) — способ лечения амблиопии, основанный на локальных раздражениях центральной ямки сетчатки светом большой яркости.

АВИАДЕНОВИРУСЫ (Aviadenovirus; лат. avis птица + аденовирусы) — род вирусов сем. аденовирусов, к к-рому относятся аденовирусы птиц; патогенность для человека не установлена.

АВИДИН — гликопротеин, содержащийся в яичном белке птиц и рептилий и обладающий свойством образовывать в организме биологически неактивный комплекс с биотином; при повышенном поступлении А. с пищей у человека развивается недостаточность биотина.

АВИДИТЕТ (франц. avidité; лат. aviditas алчность, страсть) — степень срочности антител к антигену, определяющая скорость и полноту протекания иммунных реакций, а также прочность полученного комплекса антиген — антитело.

АВИПОКСВИРУСЫ (Aviropoxvirus; лат. avis птица + поксвирусы) — род вирусов сем. поксвирусов; типичный представитель — вирус оспы птиц; для человека непатогенен.

АВИРУЛЕНТНОСТЬ (a- + вирулентность) — неспособность отдельных штаммов патогенных видов микроорганизмов вызывать заболевание.

АВИТАМИНОЗ (avitaminosis; a- + витамин + -оз) — разновидность витаминной недостаточности, характеризующаяся практической полнотой отсутствием поступления витамина в организм.

АВСИТИДИЙСКОГО — ИГУМЕНАКИСА СИМПТОМ (истор.; И.Т.Авситидийский, отец. дерматовенеролог конца 19 — начала 20 в.; Higoimenakis, греч. врач) — утолщение грудного конца правой ключицы; вероятный признак позднего врожденного сифилиса.

АВСТРАЛОПИТЕКИ (Australopithecinae; лат. australis южный + pithekos обезьяна) — ископаемые двуногие высшие приматы, систематически использовавшие для защиты и нападения камни, палки и другие предметы; предполагаемые предки древнейших людей, жившие около 2 млн. 600 тыс. лет назад.

АВТО- — 1) см. Ауто-; 2) составная часть сложных слов, означающая "автоматический", "автономный", "автомобильный".

АВТОАНАЛИЗАТОР (авто- + анализатор) — прибор (система приборов), используемый в медицине и биологии для автоматизации отдельных видов биохимических и морфологических исследований (определение концентрации компонентов смеси, скорости каталитических процессов, активности ферментов, количества, размеров и формы микроорганизмов и др.).

АВТОАНАЛИЗАТОР МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ — см. Счётчик клеток крови автоматический.

АВТОГИСТОРАДИОГРАФИЯ — см. Гисторадиодиагностика.

АВТОДЕГАЗАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ — установка на автомобиле, предназначенная для дегазации, дезинфекции, дезинсекции и подсушивания горячим воздухом обмундирования, обуви, снаряжения и индивидуальных средств защиты в полевых условиях.

АВТОДОЗИМЕТР (авто- + дозиметр) — устройство для автоматического отмеривания (отвешивания) заданного количества жидкого или сыпучего вещества; применяется, напр., в фармацевтической практике.

АВТОИНТЕРВЬЮЭР (авто- + англ. interviewer ведущий беседу) — устройство для автоматического сбора анамнестических сведений перед посещением врача путем предъявления больному на световом табло вопросов, ответы на к-рые даются по двухзначной ("да", "нет") или трехзначной ("да", "нет", "не знаю") системе нажатием соответствующей клавиши на панели А.

АВТОКАМПИГРАФИЯ (авто- + лат. campus visiois поле зрения + греч. graphō записывать) — метод исследования зрительных и глазодвигательных функций, при к-ром получаемые данные регистрируются на специальном экране самим испытуемым; используется для выявления и определения размеров скотом, определения границ поля зрения, изучения метаморфопсий и косоглазия.

АВТОКЛАВ (авто- + лат. clavis ключ) в медицине — см. Стерилизатор паровой.

АВТОМАКС — переносимый на спине ручной аппарат для распыления жидкой сжатый воздухом; применяется для дезинфекции и дезинсекции помещений и других крупных объектов.

АВТОМАТ (греч. automatos самодействующий, самопроизвольный) — устройство, осуществляющее процессы переработки информации, энергии и (или) материала без непосредственного участия человека; различные А. широко внедряются в диагностическую, лечебную и гигиеническую практику при создании современной медицинской аппаратуры, систем контроля окружающей среды и жизнеобеспечения и пр.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА — процесс в развитии машинного производства, при к-ром функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим устройствам; А.п. обуславливает изменение гигиенической характеристики труда человека.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (АСМОН) — совокупность автоматизированных лабораторий и диагностических комплексов, сопряженных с электронно-вычислительными машинами, применяемая при массовых профилактических медицинских осмотрах населения; различают АСМОН для многопрофильного и монопрофильного (напр., кардиологического) обследования.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (АСУ) — система принятия решений по управлению сложным объектом, основанная на применении математических методов и технических средств автоматической обработки информации при активном участии человека в процессе управления; разрабатываются и внедряются для системы органов здравоохранения и медицинских учреждений; следует отличать от системы автоматического управления (САУ), в к-рой человек выполняет только контрольные функции.