

Составители:

А.С. Деметьев — врач скорой помощи ФГБУЗ «Клиническая больница № 50» ФМБА России;

Н.И. Журавлева — врач-терапевт, ведущий специалист по работе с авторами ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»;

С.Ю. Кочетков — канд. мед. наук, врач-терапевт, главный редактор ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»;

Е.Ю. Чепанова — фельдшер скорой помощи ФГБУЗ «Клиническая больница № 50» ФМБА России.

- С44 **Скорая медицинская помощь. Стандарты медицинской помощи** / сост. А. С. Деметьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 504 с. — (Серия «Стандарты медицинской помощи»).

ISBN 978-5-9704-4178-7

С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», закрепляющая норму об организации и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных Минздравом России и зарегистрированных в Минюсте России.

В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. Особое внимание уделено применению стандартов по сердечно-сосудистым заболеваниям (аритмиям, острому коронарному синдрому и др.), болезням органов дыхания (пневмонии, бронхиальной астме, стенозу гортани и др.), заболеваниям нервной и эндокринной систем, психическим расстройствам, травмам. В конце книги дан краткий справочник лекарственных средств и список основных кодов МКБ-10, использующихся врачами скорой медицинской помощи.

Издание предназначено врачам и фельдшерам скорой помощи, врачам общей практики, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

УДК [614.88:616-082](470+571)(083.74)
ББК 51.1(2Рос), 23ц+53.50ц

Права на данное издание принадлежат ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». Воспроизведение и распространение в каком бы то ни было виде части или целого издания не могут быть осуществлены без письменного разрешения ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа».

© Коллектив составителей, 2017
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2017
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,
оформление, 2017

ISBN 978-5-9704-4178-7

СОДЕРЖАНИЕ

1. Порядок оказания медицинской помощи	10
Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (приказ МЗ РФ от 20.06.2013 г. № 388н, с изменениями и дополнениями от 22 января, 5 мая 2016 г.)	10
2. Стандарты медицинской помощи	82
Болезни системы кровообращения	
Стандарт скорой медицинской помощи при гипертензии (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 470н)	82
Стандарт скорой медицинской помощи при брадикардиях (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 470н)	86
Стандарт скорой медицинской помощи при тахикардиях и тахикармиях (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 464н)	89
Стандарт скорой медицинской помощи при сердечной недостаточности (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 460н)	93
Стандарт скорой медицинской помощи при кардиогенном шоке (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 455н)	96
Стандарт скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 456н)	99
Стандарт скорой медицинской помощи при остром трансмуральном инфаркте миокарда (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 457н)	103
Стандарт скорой медицинской помощи при внезапной сердечной смерти (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 454н)	107
Стандарт скорой медицинской помощи при легочной эмболии (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1126н)	110
Стандарт скорой медицинской помощи при эмболии и тромбозе артерий (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1413н)	113
Стандарт скорой медицинской помощи при расслоении аорты (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1442н)	116
Болезни дыхательной системы	
Стандарт скорой медицинской помощи при пневмонии (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 459н)	120
Стандарт скорой медицинской помощи при острой респираторной недостаточности (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 458н)	124
Стандарт скорой медицинской помощи при стенозе гортани (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1124н)	129
Стандарт скорой медицинской помощи детям при стенозе гортани (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1281н)	133
Стандарт скорой медицинской помощи при астме (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1086н)	136
Стандарт скорой медицинской помощи детям при астме (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1119н)	139

Стандарт скорой медицинской помощи при астматическом статусе (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 469н)	142
Стандарт скорой медицинской помощи при спонтанном пневмотораксе напряжения (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1407н)	146
Стандарт скорой медицинской помощи при кровотечении из верхних дыхательных путей (легочное кровотечение) (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 467н)	149
Болезни мочеполовой системы	
Стандарт скорой медицинской помощи при почечной колике (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1385н)	153
Стандарт скорой медицинской помощи при гематурии (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1386н)	156
Стандарт скорой медицинской помощи при задержке мочи (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1083н)	159
Стандарт скорой медицинской помощи при воспалительных болезнях мужских половых органов (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1116н)	162
Болезни нервной системы	
Стандарт скорой медицинской помощи при менингитах (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 462н)	165
Стандарт скорой медицинской помощи при судорогах, эпилепсии, эпилептическом статусе (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 468н)	169
Стандарт скорой медицинской помощи при острой головной боли (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 463н)	173
Стандарт скорой медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 466н)	176
Стандарт скорой медицинской помощи при воспалительной полиневропатии (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 472н)	180
Стандарт скорой медицинской помощи при тяжелой миастении (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 465н)	183
Психические расстройства и расстройства поведения	
Стандарт скорой медицинской помощи при органических, симптоматических психических расстройствах (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1397н)	186
Стандарт скорой медицинской помощи при расстройствах настроения (аффективных расстройствах) (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1419н)	190
Стандарт скорой медицинской помощи при невротических расстройствах, связанных со стрессом, и соматоформных расстройствах (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1103н)	193
Стандарт скорой медицинской помощи при расстройствах личности и поведения в зрелом возрасте (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1131н)	196
Стандарт скорой медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1443н)	199

Стандарт скорой медицинской помощи при шизофрении, шизотипических и бредовых расстройствах (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1109н)	203
Болезни эндокринной системы	
Стандарт скорой медицинской помощи при гипогликемии (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1280н)	206
Стандарт скорой медицинской помощи при гипергликемической коме (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1428н)	210
Инфекционные болезни	
Стандарт скорой медицинской помощи детям при менингококковой инфекции неуточненной (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1444н)	214
Болезни органов пищеварения	
Стандарт скорой медицинской помощи при желудочно-кишечном кровотечении (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1388н)	217
Беременность, роды и послеродовой период	
Стандарт скорой медицинской помощи при эклампсии (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1418н)	220
Стандарт скорой медицинской помощи при самопроизвольных родах (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1433н)	223
Стандарт скорой медицинской помощи при кровотечении из женских половых органов (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1401н)	225
Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин	
Стандарт скорой медицинской помощи при травмах головы (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1390н)	228
Стандарт скорой медицинской помощи при травме глаза (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1084н)	233
Стандарт скорой медицинской помощи при травмах грудной клетки (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1389н)	236
Стандарт скорой медицинской помощи при травмах живота, нижней части спины (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1123н)	241
Стандарт скорой медицинской помощи при травме позвоночника (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1457н)	246
Стандарт скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1384н)	251
Стандарт скорой медицинской помощи при травмах мужских мочеполовых органов, инородном теле в мужских мочеполовых органах, избыточной крайней плоти, фимозе и парафимозе (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1090н)	258
Стандарт скорой медицинской помощи при травмах женских мочеполовых органов, инородном теле в женских мочеполовых органах (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1078н)	261
Стандарт скорой медицинской помощи при сочетанной травме (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1394н)	264

Стандарт скорой медицинской помощи при ожогах, гипотермии (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1278н)	269
Стандарт скорой медицинской помощи при отморожениях (приказ МЗ РФ от 28.12.2012 г. № 1604н)	274
Стандарт скорой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударе (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1115н)	278
Стандарт скорой медицинской помощи при поражении электрическим током (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1120н)	281
Стандарт скорой медицинской помощи при синдроме длительного сдавления (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1399н)	285
Стандарт скорой медицинской помощи при отравлениях лекарственными средствами, медикаментами, биологическими веществами, токсическом действии веществ преимущественно немедицинского назначения (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 № 1375н)	289
Стандарт скорой медицинской помощи при отравлении наркотическими веществами (приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1114н)	295
Стандарт скорой медицинской помощи при отравлении веществами нейротропного действия (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1448н)	299
Стандарт скорой медицинской помощи при отравлениях алкоголем, органическими растворителями, галогенопроизводными алифатических и ароматических углеводородов (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1392н)	304
Стандарт скорой медицинской помощи при отравлении разъедающими веществами (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1391н)	309
Стандарт скорой медицинской помощи при отравлениях окисью углерода, другими газами, дымами и парами (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1393н)	314
Отдельные состояния	
Стандарт скорой медицинской помощи детям при лихорадке (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1441н)	319
Стандарт скорой медицинской помощи при остром животе (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1410н)	322
Стандарт скорой медицинской помощи при асфиксии (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1429н)	326
Стандарт скорой медицинской помощи при ангионевротическом отеке, крапивнице (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1430н)	330
Стандарт скорой медицинской помощи при шоке (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1445н)	334
Стандарт скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке (приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1079н)	338
Стандарт скорой медицинской помощи при сомнолентности, ступоре, неутонченной коме (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 471н)	342
Стандарт скорой медицинской помощи при обмороке (синкопе) и коллапсе (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 461н)	346
Стандарт скорой медицинской помощи детям при судорогах (приказ МЗ РФ от 05.07.2016 г. № 1091н)	349

3. Справочник лекарственных средств	352
Азаметония бромид (Azamethonii bromidum)	352
Активированный уголь (Carbo activatus)	353
Алтеплаза (Alteplasmum)	354
Аминофиллин (Aminophyllinum)	357
Амиодарон (Amiodaronum)	360
Аммиак (Liquor Ammonii caustici)	363
Аскорбиновая кислота (Acidum ascorbinicum)	364
Атропин (Atropinum)	365
Ацетилсалициловая кислота (Acidum acetylsalicylicum)	366
Ацетилцистеин (Acetylcysteinum)	368
Бетаметазон (Betamethasolum)	369
Бипериден (Biperidenum)	372
Будесонид (Budesonidum)	373
Вальпроевая кислота (Acidum valproicum)	375
Верапамил (Verapamilum)	376
Водорода пероксид (Hydrogenii peroxydum)	377
Галантамин (Galantaminum)	378
Галоперидол (Haloperidolum)	380
Гепарин натрия (Heparinum natrium)	381
Гидрокортизон (Hydrocortisonum)	382
Гидроксиэтилкрахмал (Amylum hydroxyaethylicum)	384
Дексаметазон (Dexamethasolum)	385
Декстран (Dextranum)	388
Декстрога (Dextrosum)	390
Диазепам (Diazepamum)	391
Дигоксин (Digoxinum)	393
Димеркаптопропансульфонат натрия (Natrii dimercaptopropansulfonates)	394
Динитрогена оксид (Dinitrogeni oxydum)	395
Дифенгидрамин (Diphenhydraminum)	395
Допамин (Dopaminum)	397
Дроперидол (Droperidolum)	397
Дротаверин (Drotaverinum)	398
Изосорбида динитрат (Isosorbidi dinitras)	399
Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота (Inosinum + Nicotinamidum + Riboflavinum + Acidum succinicum)	400
Ипратропия бромид + Фенотерол (Ipratropii bromidum + Phenoterolum)	402
Калия и магния аспарагинат (Kalii asparaginas + Magnii asparaginas)	403
Кальция глюконат (Calcii gluconas)	404
Каптоприл (Captoprilum)	405
Карбоксим (Carboxim)	407
Кетамин (Ketaminum)	407
Кеторолак (Ketorolacum)	408
Клонидин (Clonidinum)	409
Клопидогрел (Clopidogrelum)	410
Кофеин (Coffeinum)	411

Ксилومتазолин (Xylomethazolinum)	412
Левомепромазин (Levomepromazinum)	412
Лигнин гидролизный (Ligninum hydrolysatum)	413
Лидокаин (Lidocainum)	414
Магния сульфат (Magnesii sulfas)	416
Метамизол натрия (Metamizolum natrium)	418
Метамизол натрия + Питофенон + Фенпивериния бромид (Metamizolum natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum)	419
Метоклопрамид (Metoclopramidum)	420
Метопролол (Metoprololum)	420
Моксонидин (Moxonidinum)	421
Морфин (Morphinum)	422
Налоксон (Naloxonum)	423
Натрия оксидбутират (Natrii oxybutiras)	425
Натрия тиосульфат (Natrii thiosulfas)	425
Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид) [(Solutio Natrii chloridi composita (Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii chloridum)]	426
Нитроглицерин (Nitroglycerinum)	426
Нифедипин (Nifedipinum)	428
Норэпинефрин (Norepinephrinum)	429
Окситоцин (Oxytocinum)	430
Папаверин (Papaverinum)	431
Парацетамол (Paracetamololum)	431
Пипекурония бромид (Pipcuronii bromidum)	432
Пиридоксин (Pyridoxinum)	432
Платифиллин (Platyphyllinum)	433
Преднизолон (Prednisolonum)	434
Прокаин (Procainum)	437
Прокаинамид (Procainamidum)	438
Пропофол (Propofolum)	439
Пропранолол (Propranololum)	440
Проурокиназа (Prourokinase)	442
Сальбутамол (Salbutamololum)	443
Суксаметония йодид (Suxamethonii iodidum)	445
Суксаметония хлорид (Suxamethonii chloridum)	446
Тенектеплаза (Tenecteplasmum)	447
Тиамин (Thiaminum)	449
Тикагрелор (Ticagrelorum)	449
Тиопентал натрия (Thiopentalum Natrium)	450
Трамadol (Tramadolum)	451
Транексамовая кислота (Acidum tranexamicum)	451
Трифосаденин (Triphosadeninum)	452
Урапидил (Urapidilum)	453
Фенилэфрин (Phenylephrinum)	454
Фентанил (Phentanylum)	455
Флумазенил (Flumazenilum)	456
Фуросемид (Furosemidum)	457

Хлорамфеникол (Chloramphenicolum)	458
Хлоргексидин (Chlorhexidinum)	459
Хлоропирамин (Chloropyraminum)	460
Хлорпромазин (Chlorpromazinum)	461
Цефтриаксон (Ceftriaxonum)	462
Цинка бисвинилимидазола диацетат (Zinci bisvinylimidazoli diacetat)	463
Эноксапарин натрия (Enoxaparinum natrium)	464
Эпинефрин (Epinephrinum)	465
Эсмолол (Esmololum)	467
Этамзилат (Etamsylatum)	468
Этанол (Aethanolum)	469
Этилметилгидроксипиридина сукцинат (Aethylmethylhydroxypyridini succinas)	470
4. Коды МКБ-10 (для скорой медицинской помощи)	472

Список источников информации	502
---	------------

Приложение № 15
к Порядку оказания скорой,
в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения РФ
от 20 июня 2013 г. № 388н

**ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНИЦЫ (БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ)**

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности врача скорой медицинской помощи, станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи, стационарного отделения скорой медицинской помощи, отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи больницы (больницы скорой медицинской помощи, центра медицины катастроф) (далее — врач скорой медицинской помощи).

2. На должность врача скорой медицинской помощи назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438), по специальности «скорая медицинская помощь».

3. Основными функциями врача скорой медицинской помощи являются:

- а) оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи, включая:
 - выявление общих и специфических признаков неотложного состояния, в том числе психопатологического;
 - оценку тяжести состояния здоровья пациента;
 - определение необходимости применения специальных методов исследования, экстренности, очередности, объема, содержания и последовательности диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий;
 - интерпретацию данных инструментальной и лабораторной диагностики, обоснование поставленного диагноза, плана и тактики ведения пациента, показаний к медицинской эвакуации;
- б) обеспечение медицинской эвакуации с одновременным проведением во время транспортировки пациента мероприятий по оказанию медицинской помощи;
- в) иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Дополнительными функциями врача скорой медицинской помощи стационарного отделения скорой медицинской помощи являются:

- а) получение информации о состоянии каждого поступившего пациента от медицинских работников выездной бригады скорой медицинской помощи с внесением ее в медицинскую документацию;
- б) осуществление профилактики инфекционных заболеваний, участие в проведении ограничительных мероприятий (карантина), осуществление производственного контроля и мер в отношении больных инфекционными заболеваниями;
- в) организация консилиумов врачей, в том числе дистанционных консилиумов врачей, при необходимости с привлечением врачей-специалистов из других медицинских организаций по согласованию с заведующим стационарным отделением скорой медицинской помощи либо лицом, его замещающим;
- г) определение медицинских показаний для медицинской эвакуации пациента и сопровождение его при осуществлении медицинской эвакуации;
- д) определение медицинских показаний для направления пациента в структурные подразделения стационарного отделения скорой медицинской помощи, в специализированные отделения медицинской организации, в составе которой создано стационарное отделение скорой медицинской помощи, и сопровождение его при транспортировке;
- е) определение медицинских показаний для направления пациента на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях по согласованию со старшим врачом стационарного отделения скорой медицинской помощи;
- ж) определение медицинских показаний для направления пациента в другие медицинские организации.

5. Дополнительными функциями врача скорой медицинской помощи отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи больницы (больницы скорой медицинской помощи, центра медицины катастроф) являются:

- а) организация и проведение дистанционных консилиумов врачей с врачами других медицинских организаций по вопросам диагностики, лечения, тактики ведения пациентов;
- б) определение показаний к дальнейшему лечению пациента в условиях медицинской организации;
- в) по согласованию с руководителем отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи привлечение к оказанию скорой специализированной медицинской помощи и медицинской эвакуации врачей других специальностей.

2. Стандарты медицинской помощи

Стандарт скорой медицинской помощи при гипертензии

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: острое состояние

Стадия: любая

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации

Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная

Средние сроки лечения (количество дней): 1

Код по МКБ X*(1)

Нозологические единицы

- I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
- I11 Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь сердца с преимущественным поражением сердца)
- I12 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек
- I13 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек
- I15 Вторичная гипертензия
- I67.4 Гипертензивная энцефалопатия

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления*(2)	Усредненный показатель кратности применения
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
B01.044.001	Осмотр врачом скорой медицинской помощи	0,5	1
B01.044.002	Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи	0,5	1
1.2. Лабораторные методы исследования			
1.3. Инструментальные методы исследования			

Окончание табл.

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления*(2)	Усредненный показатель кратности применения
A05.10.004	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	0,9	1
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,9	1
1.4. Иные методы исследования			

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием			
2.3. Лабораторные методы исследования			
2.4. Инструментальные методы исследования			
2.5. Иные методы исследования			
2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и (или) реаниматологического сопровождения			
2.7. Методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации			
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных препаратов	0,1	1
A11.09.007	Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода	0,3	1
A11.12.002	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	0,5	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных препаратов	0,5	2
A23.30.042	Медицинская эвакуация	0,5	1

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата*(3)	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД*(4)	СКД*(5)
B05CB	Солевые растворы		0,5			
		Натрия хлорид		мл	200	200
	Растворы электролитов		0,1			
		Магния сульфат		мг	2500	2500
	Органические нитраты		0,3			
		Нитроглицерин		мг	10	10
C02AC	Агонисты имидазолиновых рецепторов		0,6			
		Клонидин		мг	0,1	0,1
		Моксонидин		мг	0,4	0,4
C02CA	Альфа-адреноблокаторы		0,1			
		Урапидил		мг	50	50
C03CA	Сульфонамиды		0,25			
		Фуросемид		мг	40	40
C07AB	Селективные бета-адреноблокаторы		0,05			
		Эсмолол		мг	10	10
C08CA	Производные дигидропиридина		0,05			
		Нифедипин		мг	10	10
C09AA	Ингибиторы АПФ		0,2			
		Каптоприл		мг	50	50

Окончание табл.

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата*(3)	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД*(4)	СКД*(5)
N05BA	Производные бензодиазепина		0,2			
		Диазепам		мг	20	20
V03AN	Медицинские газы		0,3			
		Кислород		л	120	120

*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

*(2) — вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.

*(4) — средняя суточная доза.

*(5) — средняя курсовая доза.

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии [часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425)].

Стандарт скорой медицинской помощи при брадикардиях

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: острое состояние

Стадия: любая

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации

Форма оказания медицинской помощи: экстренная

Средние сроки лечения (количество дней): 1

Код по МКБ X*(1)**Нозологические единицы**

- I44 Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада и блокада левой ножки пучка (Гиса)
- I45.9 Нарушение проводимости неуточненное

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления*(2)	Усредненный показатель кратности применения
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
B01.044.001	Осмотр врачом скорой медицинской помощи	0,5	1
B01.044.002	Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи	0,5	1
1.2. Лабораторные методы исследования			
1.3. Инструментальные методы исследования			
A05.10.004	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	2
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1	2
1.4. Иные методы исследования			

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием			
2.3. Лабораторные методы исследования			
2.4. Инструментальные методы исследования			
2.5. Иные методы исследования			
2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и (или) реаниматологического сопровождения			
2.7. Методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации			
A05.10.007	Мониторирование электрокардиографических данных	0,9	1
A11.09.007	Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода	0,7	1
A11.12.002	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	0,9	1
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных препаратов	0,9	3
A17.10.002	Электрокардиостимуляция	0,1	1
A23.30.042	Медицинская эвакуация	0,6	1

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата*(3)	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД*(4)	СКД*(5)
A03BA	Алкалоиды белладонны, третичные амины		0,9			
		Атропин		мг	3	3
B05XA	Растворы электролитов		0,9			
		Натрия хлорид		мл	200	200

3. Справочник лекарственных средств

Азаметония бромид (*Azamethonii bromidum*)

H-холиноблокаторы (ганглиоблокаторы)

Показания. Гипертонический криз; купирование острых приступов бронхиальной астмы; эклампсия; отек легких или головного мозга; спазм периферических сосудов, облитерирующие поражения периферических сосудов (эндартериит, атеросклероз и др.); болевой синдром при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечная, желчная, почечная колика, каузалгия; контролируемая артериальная гипотензия в анестезиологии; облегчение прохождения цистоскопа через уретру при цистоскопии у мужчин в урологии.

Противопоказания. Закрытоугольная глаукома; острая фаза инфаркта миокарда, выраженная артериальная гипотензия, шок; нарушения функции печени и (или) почек; феохромоцитомы; дегенеративные заболевания центральной нервной системы; индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы. Внутривенно, внутримышечно. Внутривенно медленно под контролем артериального давления и общего состояния. При гипертоническом кризе, отеке легких или головного мозга 0,2–0,5 мл 5% раствора, разведенных в 20 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы, или внутримышечно до 2 мл 5% раствора. Для управляемой гипотензии — внутривенно капельно 0,8–1,2 мл 5% раствора (0,04–0,06 г) перед операцией, при необходимости — 2,4–3,6 мл 5% раствора (0,12–0,18 г). Внутримышечно при спазмах сосудов и других неургентных состояниях 1 мл 5% раствора, при необходимости — по 1,5–2 мл 2–3 раза в сутки. Максимальные дозы при внутримышечном введении: разовая — 0,15 г (3 мл 5% раствора), суточная — 0,45 г (9 мл 5% раствора).

Особые указания. Лечение ганглиоблокаторами следует проводить под тщательным наблюдением врача. Для профилактики возникновения ортостатического коллапса во время терапии рекомендуется 1–2 ч до введения препарата провести в положении лежа. В начале терапии рекомендуется проверить реакцию пациента на малые дозы азаметония бромида. Для этого вводится 1/2 средней дозы и контролируется состояние пациента. Важно! При повышенном артериальном давлении гипотензивное действие носит более резкий характер. Использование препарата при открытоугольной глаукоме может приводить к снижению внутриглазного давления в результате влияния ганглиоблокаторов на продукцию водянистой влаги.

Основное торговое название. Пентамин.

Активированный уголь (*Carbo activatus*)

Энтеросорбирующее средство

Показания. Экзогенные и эндогенные интоксикации различного происхождения (в качестве детоксицирующего средства). Пищевые токсикоинфекции, дизентерия, сальмонеллез (при комплексном лечении). Отравления лекарственными препаратами (психотропными, снотворными, наркотическими средствами и др.), алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими ядами. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся диспепсией и метеоризмом. Пищевая и лекарственная аллергия. Гипербилирубинемия (вирусный гепатит и другие желтухи) и гиперазотемия (почечная недостаточность). Для уменьшения газообразования в кишечнике перед ультразвуковым и рентгенологическим исследованиями. С целью профилактики хронических интоксикаций на вредном производстве.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в том числе язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит), кровотечения из желудочно-кишечного тракта, атония кишечника, одновременное назначение антитоксических лекарственных средств, эффект которых развивается после всасывания (метионин и др.).

Способ применения и дозы. Внутрь, в таблетках или в виде водной взвеси измельченных таблеток, за 1–2 ч до или после еды и приема других лекарственных средств. Необходимое количество таблеток размешивают в 100 мл (1/2 стакана) охлажденной кипяченой воды. Взрослым назначают в среднем по 1–2 г 3–4 раза в день. Максимальная разовая доза для взрослых — до 8 г. Детям назначают в среднем из расчета 0,05 г/кг массы тела 3 раза в день. Максимальная разовая доза — до 0,2 г/кг массы тела. Курс лечения при острых заболеваниях составляет 3–5 дней, при аллергии и хронических заболеваниях — до 14 дней. Повторный курс — через 2 нед по рекомендации врача. При острых отравлениях лечение начинают с промывания желудка с использованием взвеси угля активированного, затем дают внутрь 20–30 г препарата. При метеоризме назначают внутрь по 1–2 г препарата 3–4 раза в день. Курс лечения — 3–7 дней.

Особые указания. При лечении интоксикаций необходимо создать избыток активированного угля в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации активированного угля в среде способствует десорбции связанного

вещества и его всасыванию (для предупреждения резорбции освобожденного вещества рекомендуется повторное промывание желудка и назначение угля активированного). Наличие пищевых масс в желудочно-кишечном тракте требует введения угля в высоких дозах, так как содержимое желудочно-кишечного тракта сорбируется углем и его активность снижается. Если отравление вызвано веществами, участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и другие опиаты), необходимо применять активированный уголь в течение нескольких дней. При использовании препаратов более 10–14 дней необходимо профилактическое назначение витаминов и препаратов кальция. Больным сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,047 г углеводов (0,004 ХЕ). Рекомендуется хранить в сухом месте, отдельно от веществ, выделяющих в атмосферу газы или пары. Хранение на воздухе (особенно влажном) снижает сорбционную способность.

Основные торговые названия. Карбопект, Карбосорб, Сорбекс.

Алтеплаза (Alteplase)

Фибринолитики

Показания. Инфаркт миокарда (в первые 6–12 ч), острая массивная тромбоэмболия легочной артерии, острый ишемический инсульт, тромбоз периферических артерий нижних конечностей.

Противопоказания. Геморрагический васкулит, геморрагическая ретинопатия, одновременный прием непрямых антикоагулянтов. Тяжелое или опасное кровотечение (продолжающееся или недавно перенесенное), нарушение мозгового кровообращения (внутричерепное кровоизлияние, геморрагический инсульт), в том числе в течение последних 6 мес. Новообразования с повышенным риском кровотечения, сопровождающиеся повышенным риском возникновения кровотечения, аневризма, интракраниальные хирургические вмешательства или операции на позвоночнике (в анамнезе за последние 2 мес). Тяжелая травма (в течение последних 10 дней), травматический открытый массаж сердца (в течение последних 10 дней). Акушерское родоразрешение (в течение последних 10 дней). Оперативные вмешательства, пункции кровеносных сосудов с низким давлением, например подключичной или яремной вены (в течение последних 10 дней). Тяжелая неконтролируемая артериальная гипертензия. Бактериальный эндокардит, перикардит. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в течение

3 мес после начала обострения), острый панкреатит. Артериальные или венозные мальформации. Печеночная недостаточность, цирроз печени, портальная гипертензия, активный гепатит. Варикозное расширение вен пищевода. Возраст пациента старше 70 лет.

Способ применения и дозы. Острый инфаркт миокарда. В первые 6 ч — внутривенно болюсно в дозе 15 мг в течение 1–2 мин, после чего — инфузионное введение в дозе 50 мг в течение 30 мин и 35 мг за 60 мин, до достижения максимальной дозы (100 мг). Пациентам с массой тела менее 65 кг — внутривенно болюсно в дозе 15 мг и по 0,75 мг/кг в течение 30 мин (максимум 50 мг); затем инфузия по 0,5 мг/кг в течение 60 мин (максимум 35 мг). Через 6–12 ч после возникновения симптомов препарат вводят внутривенно болюсно в дозе 10 мг и 50 мг — инфузионно в течение первого часа, а затем в дозе 10 мг в течение 30 мин (до максимальной дозы 100 мг в течение 3 ч). Пациентам с массой тела менее 65 кг препарат назначают в дозе, не превышающей 1,5 мг/кг. Одновременно назначают ацетилсалициловую кислоту и гепарин натрия. Ацетилсалициловую кислоту — по 160–300 мг в сутки после возникновения симптомов в течение нескольких месяцев; гепарин натрия — перед началом тромболитической терапии внутривенно болюсно в дозе 5 тыс. МЕ, затем по 1 тыс. МЕ/ч с учетом показателей активированного частичного тромбопластинного времени (АЧТВ), измеренного несколько раз (значения должны в 1,5–2,5 раза превосходить исходные). Острая массивная тромбоэмболия легочной артерии в сочетании с нестабильной гемодинамикой. Внутривенно болюсно в дозе 10 мг в течение 1–2 мин, затем по 90 мг внутривенно в течение 2 ч. Общая доза препарата у пациентов с массой тела менее 65 кг не должна превышать 1,5 мг/кг. Если протромбиновое время превышает исходное менее чем в 2 раза, то одновременно назначают гепарин натрия (под контролем АЧТВ). При массивной тромбоэмболии легочной артерии с нестабильной гемодинамикой препарат действует так же, как стрептокиназа. Введение алтеплазы в суммарной дозе 100 мг в течение 2 ч сравнимо с действием ретеплазы, стрептокиназы в дозе 1,5 млн МЕ в течение 2 ч, урокиназы в дозе 1 млн ЕД болюсом в течение 10 мин (затем по 2 млн ЕД внутривенно в течение 2 ч) и более эффективно, чем внутривенное капельное введение гепарина натрия по 1750 МЕ/ч. В последнем случае чаще возникают побочные эффекты. Острый ишемический инсульт — тромболизис (в том числе алтеплаза 0,9 мг/кг до 90 мг в 100 мл 0,9% натрия хлорида; 10% дозы в виде болюса,

остальное внутривенно в течение 1 ч; алтеплаза 0,85 мг/кг внутривенно в течение 60 мин в первые 90 мин и 91–180 мин после начала заболевания); алтеплаза (рекомбинантный тканевый активатор плазминогена) 1,1 мг/кг до 100 мг внутривенно, 10% дозы в виде болюса, остальное внутривенно в течение 1 ч. При местном применении в случае тромбоза периферических артерий нижних конечностей алтеплаза превосходит урокиназу. При тромбозе мозговых артерий введение 2 млн ЕД в сутки алтеплазы имеет преимущества перед внутривенным применением 60 тыс. ЕД в сутки урокиназы в течение 7 дней. Применение у детей. Эффективность и безопасность не изучены. При внутрисосудистом тромбозе препарат назначают внутривенно струйно (в стерильной воде для инъекций до получения раствора с концентрацией 1 мг/мл) или капельно (в 0,9% растворе натрия хлорида, пока концентрация не достигнет 200 мкг/мл). Нельзя разводить препарат раствором декстрозы. Новорожденным препарат вводят по 100–500 мкг/кг в час в течение 3–6 ч; детям в возрасте 1 мес — 18 лет — по 100–500 мкг/кг в час в течение 3–6 ч (максимальная суточная доза — 100 мг). Перед назначением повторного курса необходим ультразвуковой мониторинг ответа на первый курс. При окклюзии артериовенозных шунтов или катетеров детям в возрасте 1 мес — 18 лет препарат вводят непосредственно в катетер в дозе не более 2 мл (в зависимости от типа катетера) раствора с концентрацией 1 мг/мл; лизат аспирируют через 4 ч, после чего катетер промывают 0,9% раствором натрия хлорида. О применении препарата при тромбозах артерий или вен у новорожденных сведений нет.

Особые указания. При остром коронарном синдроме целесообразно проведение тромболизиса. Он способствует снижению смертности и экономически выгоден. Не обнаружено различий в выживаемости после применения тканевого активатора плазминогена, стрептокиназы и анизолированного плазминоген-стрептокиназного комплекса; обсуждается продолжительность и схема тромболитической терапии. Дополнительное лечение антикоагулянтами и антиагрегантами, вероятно, повышает эффективность тромболитической терапии. Чем раньше проведен тромболизис, тем он эффективнее. Именно поэтому тромболизис нужно ввести в повседневную практику лечебных учреждений. Следует принимать во внимание риск необходимости реанимационных мероприятий, связанных с проведением тромболизиса. В амбулаторной практике препаратом выбора считают урокиназу (болюсное введение тенектеплазы или ретеплазы), в стационарных условиях — стрептокиназу (кроме случаев, когда пациенты получали

ее ранее). Новые средства (алтеплаза) более дорогостоящи и поэтому не могут быть препаратами первой линии. Мониторинг коагулограммы (АЧТВ, фибриноген, продукты деградации фибрина, тромбин, тромбиновое время), гематокрита, концентрации гемоглобина, количества тромбоцитов, электрокардиограммы (при тромбозе коронарной артерии); при тромбозе сосудов головного мозга — контроль психического и неврологического статуса (до начала лечения и периодически во время приема препарата). Для оценки лечения в динамике используют один или несколько критериев; артериальное давление, пульс и частоту дыхания определяют регулярно. Риск развития геморрагических осложнений возрастает при применении доз препарата, превышающих 100 мг. Следует соотносить потенциальный риск и пользу применения алтеплазы после недавно перенесенных незначительных травм (биопсия, пункция сосудов, внутримышечные инъекции, массаж сердца) и при других состояниях, сопровождающихся риском развития кровотечений, при беременности, в течение первых 10 сут послеродового периода (повышенный риск кровотечений), во время кормления грудью, в пожилом возрасте и у детей.

Основное торговое название. Актилизе.

Аминофиллин (Aminophyllinum)

Муколитики и стимуляторы моторной функции дыхательных путей

Показания. Для приема внутрь: бронхообструктивный синдром различного генеза [в том числе бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), включая эмфизему легких, хронический обструктивный бронхит], гипертензия в малом круге кровообращения, легочное сердце, ночное апноэ; острая и хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии). Для парентерального применения: астматический статус (дополнительная терапия), апноэ новорожденных, нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу (в составе комбинированной терапии), левожелудочковая недостаточность с бронхоспазмом и нарушением дыхания по типу Чейна—Стокса, отечный синдром почечного генеза (в составе комплексной терапии); острая и хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии).

Противопоказания. Гиперчувствительность, в том числе к другим производным ксантина: пентоксифиллину, кофеину, теобромину, этилендиамину. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения для пероральных форм), гастрит с повышенной

4. Коды МКБ-10 (для скорой медицинской помощи)

НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ (A00-B99)	
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ (A00-A09)	
A02	Другие сальмонеллезные инфекции
A03	Шигеллез
A03.8	Другой шигеллез
A03.9	Шигеллез неуточненный
A04	Другие бактериальные кишечные инфекции
A04.8	Другие уточненные бактериальные кишечные инфекции
A04.9	Бактериальная кишечная инфекция неуточненная
A05	Другие бактериальные пищевые отравления
A05.1	Ботулизм
A05.8	Другие уточненные бактериальные пищевые отравления
A05.9	Бактериальное пищевое отравление неуточненное
A07.9	Протозойная кишечная болезнь неуточненная
A08	Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции
A08.0	Ротавирусный энтерит
A08.2	Аденовирусный энтерит
A08.3	Другие вирусные энтериты
A08.4	Вирусная кишечная инфекция неуточненная
A08.5	Другие уточненные кишечные инфекции
A09	Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения
ТУБЕРКУЛЕЗ (A15-A19)	
A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически
A16.7	Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении
A16.8	Туберкулез других органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении
A16.9	Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении
A18	Туберкулез других органов
A18.8	Туберкулез других уточненных органов
НЕКОТОРЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЗООНОЗЫ (A20-A28)	
A25.9	Лихорадка от укуса крыс неуточненная
A26	Эризипеллоид
A26.0	Кожный эризипеллоид
A26.8	Другие формы эризипелоида
A26.9	Эризипеллоид неуточненный

A28.1	Лихорадка от кошачьих царапин
A28.8	Другие уточненные бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках
A28.9	Бактериальные зоонозы неуточненные
ДРУГИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ (A30-A49)	
A36	Дифтерия
A36.0	Дифтерия глотки
A36.1	Дифтерия носоглотки
A36.2	Дифтерия гортани
A36.8	Другая дифтерия
A36.9	Дифтерия неуточненная
A37	Коклюш
A37.9	Коклюш неуточненный
A38	Скарлатина
A39	Менингококковая инфекция
A39.0	Менингококковый менингит (G01*)
A39.3	Хроническая менингококкемия
A39.4	Менингококкемия неуточненная
A39.8	Другие менингококковые инфекции
A39.9	Менингококковая инфекция неуточненная
A41	Другая септицемия
A46	Рожа
A48	Другие бактериальные болезни, не классифицированные в других рубриках
A48.3	Синдром токсического шока
A48.8	Другие уточненные бактериальные болезни
A49	Бактериальная инфекция неуточненной локализации
A49.0	Стафилококковая инфекция неуточненная
A49.1	Стрептококковая инфекция неуточненная
A49.9	Бактериальная инфекция неуточненная
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (A50-A64)	
A51.0	Первичный сифилис половых органов
A51.3	Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек
A51.4	Другие формы вторичного сифилиса
A51.9	Ранний сифилис неуточненный
A53	Другие и неуточненные формы сифилиса
A53.9	Сифилис неуточненный
A60.0	Герпетические инфекции половых органов и мочевого тракта

Продолжение табл.

A63	Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках
A63.8	Другие уточненные заболевания, передающиеся преимущественно половым путем
A64	Болезни, передающиеся половым путем, неуточненные
ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ СПИРОХЕТАМИ (A65-A69)	
A69.2	Болезнь Лайма
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (A80-A89)	
A80	Острый полиомиелит
A80.3	Острый паралитический полиомиелит другой и неуточненный
A80.9	Острый полиомиелит неуточненный
A81	Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы
A81.9	Медленная вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная
A82	Бешенство
A82.9	Бешенство неуточненное
A84	Клещевой вирусный энцефалит
A84.8	Другие клещевые вирусные энцефалиты
A84.9	Клещевой вирусный энцефалит неуточненный
A85	Другие вирусные энцефалиты, не классифицированные в других рубриках
A85.2	Вирусный энцефалит, передаваемый членистоногими, неуточненный
A86	Вирусный энцефалит неуточненный
A87	Вирусный менингит
A87.8	Другой вирусный менингит
A87.9	Вирусный менингит неуточненный
A88	Другие вирусные инфекции центральной нервной системы, не классифицированные в других рубриках
A89	Вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная
ВИРУСНЫЕ ЛИХОРАДКИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЧЛЕНИСТОНОГИМИ, И ВИРУСНЫЕ ГЕМОРАГИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДКИ (A90-A99)	
A98.5	Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
A98.8	Другие уточненные вирусные геморрагические лихорадки
A99	Вирусная геморрагическая лихорадка неуточненная
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ ПОРАЖЕНИЯМИ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК (B00-B09)	
B00	Инфекции, вызванные вирусом герпеса [herpes simplex]
B00.8	Другие формы герпетических инфекций
B00.9	Герпетическая инфекция неуточненная
B01	Ветряная оспа [varicella]
B01.8	Ветряная оспа с другими осложнениями

Продолжение табл.

B01.9	Ветряная оспа без осложнений
B02	Опоясывающий лишай [herpes zoster]
B02.2	Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы
B02.8	Опоясывающий лишай с другими осложнениями
B02.9	Опоясывающий лишай без осложнений
B03	Оспа
B05	Корь
B05.8	Корь с другими осложнениями
B05.9	Корь без осложнений
B06	Краснуха [немецкая корь]
B06.8	Краснуха с другими осложнениями
B06.9	Краснуха без осложнений
B08	Другие вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек, не классифицированные в других рубриках
B08.8	Другие уточненные инфекции, характеризующиеся поражением кожи и слизистых оболочек
B09	Вирусная инфекция, характеризующаяся поражением кожи и слизистых оболочек, неуточненная
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ (B15-B19)	
B15	Острый гепатит А
B16	Острый гепатит В
B17.1	Острый гепатит С
B17.2	Острый гепатит Е
B18	Хронический вирусный гепатит
B18.2	Хронический вирусный гепатит С
B18.8	Другой хронический вирусный гепатит
B18.9	Хронический вирусный гепатит неуточненный
B19	Вирусный гепатит неуточненный
БОЛЕЗНЬ, ВЫЗВАННАЯ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА [ВИЧ] (B20-B24)	
B20	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней
B23.0	Острый ВИЧ-инфекционный синдром
B23.8	Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний
B24	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточненная
ДРУГИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ (B25-B34)	
B26	Эпидемический паротит
B30	Вирусный конъюнктивит
B30.9	Вирусный конъюнктивит неуточненный
B34	Вирусные инфекции неуточненной локализации